

# Tasectan®

## ΕΝΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

Το Tasectan® είναι ένα ιατροτεχνολογικό σκεύασμα, που χρησιμοποιείται για την αποκατάσταση της φυσιολογικής λειτουργίας των τοιχωμάτων του εντέρου. Είναι ειδικά σχεδιασμένο για τον έλεγχο και την μείωση των συμπτωμάτων που σχετίζονται με την διάρροια διαφόρου αιτιολογίας, όπως κοιλιακή διάταση και συχνές κενώσεις. Είναι αποτελεσματικό εντός 12 ωρών.

Το σύμπλοκο ζελατίνης-ταννικού οξέος από το οποίο αποτελείται το σκεύασμα δεν μεταβάλλεται στο στομάχι και δρα σχηματίζοντας ένα μανδύα που προστατεύει τον εντερικό βλεννογόνο, μειώνοντας τη συχνότητα και τη διάρκεια των επεισοδίων της διάρροιας.

## ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

- 20 φακελλίσκοι που περιέχουν σκόνη για παιδιατρική χρήση
- Blister με 15 κάψουλες για χρήση από ενήλικες

## ΣΥΝΘΕΣΗ

Σκόνη για παιδιατρική χρήση: 250 mg Gelatine tannate (χοίρειας προέλευσης)

Κάψουλες: 500 mg Gelatine tannate (χοίρειας προέλευσης), Corn Starch και Magnesium stearate (φυτικής προέλευσης)

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Κάψουλες: Καταπιείτε την κάψουλα με υγρά.

Σκόνη: Το περιεχόμενο ενός φακελλίσκου πρέπει να αναμιχθεί με μικρή ποσότητα υγρού, που να μην είναι καυτό, όπως γάλα, φρουτοχυμό ή νερό και να κορηγηθεί αμέσως. Μπορεί επίσης να προστεθεί σε γιαούρτι ή οποιοδήποτε άλλο φαγητό. Μην κορηγείτε το σκεύασμα απευθείας, χωρίς να το έχετε αναμίξει.

## ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ

**Ενήλικες και παιδιά άνω των 14 ετών:** 1-2 κάψουλες κάθε 4-6 ώρες μέχρι την πλήρη υποχώρηση των συμπτωμάτων.

**Παιδιά κάτω των 3 ετών:** 1 φακελλίσκος κάθε 6 ώρες μέχρι την πλήρη υποχώρηση των συμπτωμάτων.

**Παιδιά από 3 μέχρι 14 ετών:** 1 ή 2 φακελλίσκοι κάθε 6 ώρες μέχρι την πλήρη υποχώρηση των συμπτωμάτων

## ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- Η συμβουλή επαγγελματία υγείας πριν από τη χρήση του σκευάσματος δεν είναι αναγκαία. Ωστόσο, τέτοια συμβουλή συστήνεται σε περίπτωση σοβαρών ή επίμονων συμπτωμάτων, ή όταν υπάρχουν αμφιβολίες για τη διάγνωση.
- Σε περίπτωση διάρροιας σε παιδιά κάτω των 3 ετών και ηλικιωμένα άτομα, και ιδιαιτέρως όταν υπάρχουν και άλλα συμπτώματα, συστήνεται να ζητηθεί η συμβουλή επαγγελματία υγείας.
- Αυτό το ιατροτεχνολογικό σκεύασμα δεν είναι φαρμακευτική θεραπεία. Αν συστηθεί τέτοια θεραπεία από επαγγελματία υγείας, το ιατροτεχνολογικό σκεύασμα μπορεί να συγχορηγηθεί.
- Συστήνεται άφθονη πρόσληψη υγρών και τα συνθή διαιτητικά μέτρα, που χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση της διάρροιας.
- Αν και δεν έχουν αναφερθεί ανεπιθύμητες ενέργειες, συστήνεται το προϊόν να μη χρησιμοποιείται κατά την διάρκεια της κύησης ή της γαλουχίας, εκτός αν δοθεί διαφορετική οδηγία από επαγγελματία υγείας.
- Μην χρησιμοποιήσετε το σκεύασμα μετά την ημερομηνία λήξης, που είναι τυπωμένη στη συσκευασία.
- Μην χρησιμοποιήσετε το σκεύασμα, εάν το blister ή οι φακελλίσκοι είναι ανοιγμένα ή έχουν καταστραφεί.
- Αυτό το ιατροτεχνολογικό σκεύασμα δεν απαιτεί ειδικές συνθήκες φύλαξης. Μην το ψύχετε.
- Φυλάξτε το σκεύασμα μακριά από τα παιδιά.

## ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Το Tasectan® δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από ασθενείς με διαγνωσμένη υπερευαισθησία στο gelatin tannate ή στα άλλα συστατικά του σκευάσματος.



NOVENTURE, S.L. Avenida Diagonal, 549, 5ª planta 08029 Barcelona España



Galenica a.e. Ελευθερίας 4, Κηφισιά 145 64, τηλ: 210 5281700

# Tasectan<sup>®</sup>

## INTENDED USE

---

Tasectan<sup>®</sup> is a medical device used to restore the physiological function of the intestinal walls. It is specifically formulated to control and reduce the symptoms associated with diarrhoea resulting from various causes, such as abdominal tension and frequent defecation. It is effective within 12 hours.

The Gelatine Tannate of which the product is composed is not altered in the stomach and acts by forming a film which protects the intestinal mucosa, reducing the frequency and duration of diarrhoea episodes.

## PRESENTATIONS

---

- Twenty sachets containing powder for pediatric use.
- Blister pack containing fifteen capsules for adult use.

## COMPOSITION

---

Powder: 250 mg Gelatine Tannate (Porcine origin).

Capsules: 500 mg Gelatine Tannate (Porcine origin), Corn Starch and Magnesium Stearate (Vegetable origin).

## INSTRUCTIONS OF USE

---

Powder: the content of one sachet must be mixed with a small quantity of a not hot drink such as milk, fruit juices or water and administered immediately. It can also be added to yoghurt or any other food. Do not administer the product directly without mixing it.

Capsules: Swallow the capsule with liquids.

## DOSAGE

---

Children under 3 years: 1 sachet every 6 hours until symptoms disappear.

Children aged 3 to 14 years: 1 or 2 sachets every 6 hours until symptoms disappear.

Adults and children older than 14 years: 1-2 capsules every 4-6 hours until symptoms disappear.

## WARNINGS

---

- Consultation with a healthcare professional before using the product is not necessary. However such consultation is advisable in case of severe or persistent symptoms or when there are doubts on the diagnosis.
- In the case of diarrhoea in children below 3 years and elderly people, consultation with a healthcare professional is recommended, especially when other symptoms are present.
- This medical device is not a pharmacological treatment. If such treatment is recommended by a healthcare professional, the device can be administered concomitantly.
- An abundant intake of liquid and dietary measures accepted in the management of diarrhoea is recommended.
- Even though no side effects are known, it is recommended that the product is not used during pregnancy or breastfeeding, unless otherwise indicated by a healthcare professional.
- Do not use the product after the expiry date printed on the package.
- Do not use the product if the blister or sachets are opened or damaged.
- This medical device does not require special storage conditions. Do not freeze.
- Keep product out of reach of children.

## CONTRAINDICATIONS AND UNDESIRE EFFECTS

---

Tasectan<sup>®</sup> must not be used in patients with known hypersensitivity to Gelatine Tannate or any other ingredient of the product.



NOVENTURE, S.L. Avenida Diagonal, 549, 5<sup>ª</sup> planta 08029 Barcelona España



Galénica s.a. 4, Eleftherias str, 145 64 Kifissia, Greece, tel: +30 210 5281700

